

ИНСТРУКЦИЯ  
по ветеринарному применению лекарственного препарата  
Диаркан

(Организация-разработчик: Сева Санте Анималь, 10 авеню де ла Балластьер, 33500, Либурн, Франция/ Ceva Sante Animale, 10 avenue de la Ballastiere, 33500, Libourne, France.)

Номер регистрационного удостоверения: 250-3-1.15-25247/17BP-3-5,0/02473

I. Общие сведения.

1. Наименование лекарственного препарата для ветеринарного применения:  
торговое наименование: Диаркан (Diarkan);  
международные непатентованные наименования действующих веществ:  
сульфагуанидин, бензонафтол.

2. Лекарственная форма: таблетки жевательные.

Диаркан в качестве действующих веществ в одной таблетке содержит: сульфагуанидин - 300 мг, бензонафтол - 100 мг, а в качестве вспомогательных веществ экстракт корня ратании - 280 мг и сахарозу до 8 г.

3. По внешнему виду Диаркан представляет собой жевательную таблетку (в виде сахарного кубика), с разделяющей бороздкой посередине, от розовато-коричневого до коричневого цвета, на поверхности кубика допускается разнотонность.

Срок годности лекарственного препарата при соблюдении условий хранения – 5 лет со дня производства. Лекарственный препарат не подлежит длительному хранению после вскрытия первичной упаковки. Лекарственный препарат запрещено применять по истечении срока годности.

4. Выпускают Диаркан расфасованным по 8 таблеток в полимерные блистеры, индивидуально упакованные в картонные пачки вместе с инструкцией по применению.

5. Хранят лекарственный препарат в закрытой упаковке производителя, в защищенном от прямых солнечных лучей месте, отдельно от продуктов питания и кормов, при температуре от 0 °С до 25 °С.

6. Диаркан следует хранить в местах, недоступных для детей.

7. Неиспользованный препарат утилизируют в соответствии с требованиями законодательства.

8. Отпускается без рецепта ветеринарного врача.

## II. Фармакологические свойства.

9. Фармакотерапевтическая группа лекарственного препарата для ветеринарного применения: сульфаниламиды в комбинациях.

10. Сульфатуанидин, входящий в состав лекарственного препарата, обладает антибактериальной активностью в отношении кишечной палочки и сальмонелл, как и другие сульфаниламиды, является конкурентным антагонистом парааминобензойной кислоты, препятствует образованию тетрагидрофолиевой кислоты, что в свою очередь нарушает образование пуриновых и пиримидиновых оснований.

При пероральном применении сульфатуанидин практически не всасывается, создавая высокие бактериостатические концентрации. Выводится из организма в основном в неизменном виде с фекалиями.

Бензонафтол распадается в кишечнике на бензойную кислоту и  $\beta$ -нафтол, которые оказывают антисептическое действие, выводится с мочой и калом.

Диаркан по степени воздействия на организм относится к малоопасным веществам (4 класс опасности по ГОСТ 12.1.007-76).

## III. Порядок применения.

11. Диаркан применяют собакам и кошкам для лечения энтеритов бактериальной этиологии, вызванных микроорганизмами, чувствительными к сульфатуанидину и бензонафтолу.

12. Диаркан противопоказан к применению при выраженных нарушениях функции почек и печени, мочекаменной болезни, повышенной чувствительности к сульфаниламидным препаратам.

13. При работе с Диарканом следует соблюдать общие правила личной гигиены и техники безопасности, предусмотренные при работе с лекарственными препаратами для ветеринарного применения.

Людям с гиперчувствительностью к компонентам препарата следует избегать прямого контакта с Диарканом. В случае появления аллергических реакций и/или при случайном попадании лекарственного препарата в организм человека следует немедленно обратиться в медицинское учреждение (при себе иметь инструкцию по применению препарата или этикетку).

Упаковку из-под использованного препарата помещают в полиэтиленовый пакет и утилизируют с бытовыми отходами.

14. Лекарственный препарат не предназначен для применения самкам во время беременности, а также щенкам и котятм в подсосный период и массой менее 1 кг.

15. Диаркан назначают животному перорально 2 раза в сутки с интервалом 12 часов, в тяжелых случаях заболевания – 3 раза в сутки с интервалом 8 часов в течение 3-5 дней в следующих дозах:

кошкам и карликовым собакам (1-5 кг)	0,5 таблетки
маленьким собакам (5-15 кг)	1,0 таблетка
средним собакам (15-30 кг)	1,5 таблетки
большим собакам (30 кг и больше)	2,0 таблетки

Лекарственный препарат добавляют в корм или питьевую воду, собакам скармливают с руки хозяина.

16. Побочных явлений и осложнений при применении лекарственного препарата в соответствии с настоящей инструкцией, как правило, не наблюдается. У некоторых животных возможны кристаллурия, рвота, аллергические реакции в

виде крапивницы или дерматитов. В этом случае применение препарата прекращают и животному назначают антигистаминные препараты и средства симптоматической терапии.

17. При передозировке препарата могут наблюдаться симптомы нарушения функции желудочно-кишечного тракта (рвота, диарея). В этом случае рекомендуется промывание желудка и симптоматическое лечение.

18. Не рекомендуется совместное применение Диаркана с препаратами, повышающими кислотность мочи (аскорбиновая кислота, гексаметилентетрамин) из-за высокой вероятности развития кристаллурии, с препаратами с высокой степенью связывания с белками сыворотки крови (НПВС, кумариновые антикоагулянты, дефинин, производные сульфонилмочевины), в связи с возможным усилением их токсичности.

19. Для предупреждения кристаллурии в период применения лекарственного препарата рекомендуется обильное поение, для этого животному следует обеспечить свободный доступ к воде.

20. Следует избегать пропуска очередной дозы лекарственного препарата, так как это может привести к снижению терапевтической эффективности. В случае пропуска одной дозы применение препарата возобновляют в той же дозировке и по той же схеме.

21. Диаркан не предназначен для применения продуктивным животным.

Наименование и адрес производственной площадки производителя лекарственного препарата для ветеринарного применения.

ООО «АВЗ С-П», Россия, 141305, Московская область, г. Сергиев Посад, ул. Центральная, д.1

Наименование, адрес организации, уполномоченной держателем или владельцем регистрационного удостоверения лекарственного препарата на принятие претензий от потребителя.

ООО «Сева Санте Анималь», 109428, Россия, г. Москва, Рязанский проспект, д. 16, тел.: (495) 729-59-90.