

СОГЛАСОВАНО
Заместитель Руководителя
Россельхознадзора

01.02.2023

ИНСТРУКЦИЯ

по ветеринарному применению лекарственного препарата
КонтрСекс Нео® капли для кошек и сук

(Организация-разработчик: ООО «НВП «Астрафарм», 117246, г. Москва
ул. Научный проезд, д. 20 стр.3, этаж 3, помещение I, комната 35)

Номер регистрационного удостоверения: 77-3-11.15-3933№ПВР-3-6.0/02599

I. Общие сведения

1. Торговое наименование: КонтрСекс Нео® капли для кошек и сук (ContrSex Neo guttae pro cattarum et canum feminarum).

Международное непатентованное наименование действующих веществ: бутират мепрегенола и этинилэстрадиол.

2. Лекарственная форма: капли для приема внутрь.

КонтрСекс Нео® капли для кошек и сук в качестве действующих веществ в 1 мл содержат: ацетобумедон (бутират мепрегенола) - 1,20 мг и этинилэстрадиол - 0,01 мг, в качестве вспомогательного вещества соевое масло.

3. По внешнему виду лекарственный препарат представляет собой прозрачную жидкость светло-желтого цвета.

Срок годности лекарственного препарата при соблюдении условий хранения в закрытой упаковке производителя – 2 года со дня производства.

Лекарственный препарат КонтрСекс Нео® капли для кошек и сук запрещается применять по истечении срока годности.

4. КонтрСекс Нео® капли для кошек и сук выпускают расфасованными по 1,0; 2,0; 3,0; 4,0 и 5,0 мл во флаконы полиэтиленовые с насадками-дозаторами. Флакон полиэтиленовый укупоривают навинчиваемой крышечкой с контролем первого вскрытия и поштучно упаковывают в картонную пачку с инструкцией по применению.

5. Хранить лекарственный препарат следует в закрытой упаковке производителя, в защищенном от света месте, отдельно от пищевых продуктов и кормов, при температуре от 0 °С до 25 °С.

6. Лекарственный препарат КонтрСекс Нео® капли для кошек и сук следует хранить в местах, недоступных для детей.

7. Неиспользованный лекарственный препарат утилизируют в соответствии с требованиями законодательства.

8. Условия отпуска: отпускается по рецепту.

II. Фармакологические свойства

9. Фармакотерапевтическая группа: гормоны и их антагонисты.

10 КонтрСекс Neo® капли для кошек и сук – бигормональный контрацептивный лекарственный препарат, содержащий в качестве действующих веществ гормоны: гестаген – ацетобумедон и эстроген – этинилэстрадиол.

Ацетобумедон блокирует в гипоталамусе медиобазальные зоны, высвобождающие гонадолиберин который является пусковым механизмом секреции гипофизом фолликулостимулирующего (ФСГ) и лютеинизирующего (ЛГ) гормонов, ответственных за развитие в яичниках фолликулов и их овуляцию.

Этинилэстрадиол в комплексе с ацетобумедоном усиливает контрацептивный эффект, изменяя биологические свойства влагалищной слизи, вязкость слизи шейки матки, что тормозит подвижность сперматозоидов, а изменения в эндометрии матки препятствуют имплантации оплодотворенной яйцеклетки.

Действующие вещества лекарственного препарата хорошо всасываются в кишечнике и, биотрансформируясь в печени, полностью выводятся из организма с мочой в виде метаболитов в течение 48 часов.

КонтрСекс Neo® капли для кошек и сук по степени воздействия на организм относят к малоопасным веществам (4 класс опасности по ГОСТ 12.1.007-76), в рекомендуемых дозах не оказывают отрицательного влияния на организм животных.

III. Порядок применения

11. Бигормональный контрацептивный лекарственный препарат КонтрСекс Neo® капли для кошек и сук применяют для регуляции половой охоты:

- кошкам - для прерывания течки и поддержания успокаивающего эффекта (задержки течки), а также для предотвращения нежелательной беременности;
- сукам – для прерывания и задержки течки, а также для предотвращения нежелательной беременности.

12. Лекарственный препарат противопоказан животным, не достигшим половой зрелости, беременным и кормящим самкам, а также при новообразованиях молочной железы и заболеваниях половых органов, сахарном диабете, мочекаменной болезни и индивидуальной непереносимости компонентов.

13. При применении лекарственного препарата КонтрСекс Neo® капли для кошек и сук следует соблюдать общие правила личной гигиены и техники безопасности, предусмотренные при работе с лекарственными средствами. По окончании работы руки вымыть теплой водой с мылом.

При случайном контакте лекарственного препарата с кожей или слизистыми оболочками глаз, их необходимо промыть большим количеством проточной воды. Людям с гиперчувствительностью к компонентам препарата следует избегать прямого контакта с препаратом КонтрСекс Neo® капли для кошек и сук.

Пустую тару из-под лекарственного препарата запрещается применять для бытовых целей, она подлежит утилизации с бытовыми отходами.

В случае проявления аллергических реакций или при случайном попадании препарата в организм человека следует немедленно обратиться в медицинское учреждение (при себе иметь инструкцию по применению препарата или этикетку).

14. Запрещается применение лекарственного препарата КонтрСекс Neo® капли для кошек и сук в период беременности и лактации, а также потомству до достижения половозрелого возраста.

15. Лекарственный препарат вводят перорально, капая на корень языка, на нос или в корм. Дозировка зависит от массы тела животного и цели применения (см. таблицу):

Таблица

Вид животного	Назначение ЛПП		Масса тела животного, кг	Дозировка	Курс применения	Примечания
Кошки	Регуляция половой охоты	Прерывание течки	До 5 кг 5,1-10 кг	4 капли 4-8 капель	1 раз в день в течение 3-5 дней	1. Применяют при первых признаках половой охоты, но не позднее 2-х дней с момента ее начала. 2. Рекомендуется проводить курс прерывания половой охоты не более 2-х раз в год.
		Поддержание успокаивающего эффекта (задержка течки)	Независимо от массы тела животного	4 капли	Регулярно 1 раз в 10-14 дней	1. Начало приема - в период покоя или через 10 дней после исчезновения признаков половой охоты. 2. Продолжительность курса по задержке течки не более 18 месяцев.
	Предотвращение нежелательной беременности после спаривания		Независимо от массы тела животного	8 капель	Двукратно с интервалом 24 часа	1. Применяют не позднее 24 часов после случайного спаривания. 2. Более поздний срок дачи лекарственного препарата значительно снижает эффект воздействия.
Суки	Регуляция половой охоты	Прерывание течки	до 5 кг 5,1-10 кг 10,1-30 кг	2 капли 2-4 капли 4-12 капель	2 раза в день с интервалом 12 ч в течение 5-7 дней	1. Применяют при первых признаках половой охоты, но не позднее 2-х дней с момента ее начала. 2. Прерывание течки рекомендуется проводить не более 1-го раза в год.
		Задержка течки	свыше 30 кг	12+2 капли на каждые последующие 5 кг массы тела	2 раза в день с интервалом 12 ч в течение 7 дней	1. Применяют за 7-14 дней до предполагаемой течки. 2. Данный курс позволяет сдвинуть течку примерно на 20-40 дней. 3. Задержку течки рекомендуется проводить не более 2-х раз в год.
	Предотвращение нежелательной беременности после спаривания				Двукратно с интервалом 24 часа	1. Применяют не позднее 24 часов после случайного спаривания. 2. Более поздний срок дачи лекарственного препарата значительно снижает эффект воздействия.

Молодым животным в первую течку применять не рекомендуется из-за трудности определения времени начала половой охоты.

Через 2 – 3 месяца после отмены лекарственного препарата происходит полное восстановление репродуктивной функции организма.

16. Побочных явлений и осложнений при применении лекарственного препарата КонтрСекс Neo® капли для кошек и сук в соответствии с настоящей инструкцией не наблюдается.

При индивидуальной непереносимости компонентов лекарственного препарата его применение прекращают.

17. Симптомы передозировки при применении лекарственного препарата не выявлены.

18. Информация об особенностях взаимодействия лекарственного препарата КонтрСекс Neo® капли для кошек и сук с другими лекарственными препаратами отсутствует.

19. Особенности действия лекарственного препарата КонтрСекс Neo® капли для кошек и сук при первом применении или при отмене не установлено.

20. Следует избегать пропусков очередной дозы лекарственного препарата, так как это может привести к снижению терапевтической эффективности. В случае несоблюдения установленного срока повторного применения препарата, его следует применить как можно быстрее, в той же дозировке и по той же схеме. При задержке в приеме лекарственного препарата менее 12 часов, терапевтическая эффективность не снижается.

21. Лекарственный препарат КонтрСекс Neo® капли для кошек и сук не предназначен для применения продуктивным животным.

Наименования и адреса производственных площадок производителей лекарственного препарата для ветеринарного применения.

1. ООО «НПК «СКИФФ», 117246, г. Москва, Научный проезд, дом 20, стр. 3. Тел/факс: (495) 785-83-50/70.

2. ООО «НВП «Астрафарм», 117246, г. Москва, Научный проезд, дом 20, стр. 3. Тел/факс: (495) 785-83-50/70.

Наименование, адрес организации, уполномоченной держателем или владельцем регистрационного удостоверения лекарственного препарата на принятие претензий от потребителя.

ООО «НВП «Астрафарм» 117246, г. Москва, Научный проезд, дом 20, стр. 3, этаж 3, помещение I, комната 35. Тел/факс: (495) 785-83-50/70.

Заместитель директора
ООО «НВП «Астрафарм»



О. Сиротюк