

СОГЛАСОВАНО
Заместитель Руководителя
Россельхознадзора

01.02.2023

ИНСТРУКЦИЯ

по ветеринарному применению лекарственного препарата
СЕКС БАРЬЕР® капли для собак

(Организация-разработчик ООО «НПК «СКИФФ»; 117246, г. Москва,
Научный проезд дом 20, строение 3, этаж 2, помещение 204)

Номер регистрационного удостоверения: 77-3-3.0-3660№ПВР-3-1.5/01394

I. Общие сведения

1. Наименование лекарственного препарата для ветеринарного применения:

торговое наименование: СЕКС БАРЬЕР® капли для собак (SEX BARRIER guttae pro canum).

международное непатентованное наименование действующих веществ: мепрегенолацетат, этинилэстрадиол.

2. Лекарственная форма: капли для приема внутрь.

СЕКС БАРЬЕР® капли для собак выпускают в двух дозировках, содержащих в качестве действующих веществ в 1 мл:

- «для сук»: мепрегенолацетат водорастворимый – 2,00 мг и этинилэстрадиол - 0,02 мг;

- «для кобелей»: мепрегенолацетат водорастворимый – 6,00 мг и этинилэстрадиол - 0,30 мг.

В качестве вспомогательного вещества СЕКС БАРЬЕР® капли для собак содержат: оливковое масло.

3. По внешнему виду лекарственный препарат представляет собой прозрачную жидкость светло-жёлтого, зеленовато-жёлтого или золотисто-жёлтого цвета.

Срок годности лекарственного препарата при соблюдении условий хранения в закрытой упаковке производителя - 2 года со дня производства.

СЕКС БАРЬЕР® капли для собак запрещается применять по истечении срока годности.

4. СЕКС БАРЬЕР® капли для собак выпускают расфасованными по 2, 3 и 5 мл во флаконы полиэтиленовые с насадками-дозаторами. Флакон полиэтиленовый укупоривают навинчиваемой крышечкой с контролем первого вскрытия, упаковывают в блистер и поштучно упаковывают в картонные пачки с инструкцией по применению.

5. Хранят СЕКС БАРЬЕР[®] капли для собак в закрытой упаковке производителя, в защищенном от прямых солнечных лучей месте, отдельно от пищевых продуктов и кормов, при температуре от 0 °С до 25 °С.

6. СЕКС БАРЬЕР[®] капли для собак следует хранить в местах, недоступных для детей.

7. Неиспользованный лекарственный препарат утилизируют в соответствии с требованиями законодательства.

8. Условия отпуска: отпускается по рецепту.

II. Фармакологические свойства

9. Фармакотерапевтическая группа: гормоны и их антагонисты.

10. СЕКС БАРЬЕР[®] капли для собак - бигормональный контрацептивный лекарственный препарат, содержащий в качестве действующих веществ гормоны: гестаген – мепрегенолацетат водорастворимый и эстроген – этинилэстрадиол.

Мепрегенолацетат водорастворимый и этинилэстрадиол, воздействуя на гипоталамо-гипофизарную систему животных, снижают секрецию из гипофиза гонадотропных гормонов (ФСГ и ЛГ). Вследствие этого происходит угнетение фолликулогенеза в яичниках и прекращается овуляция фолликулов.

Этинилэстрадиол в комплексе с мепрегенолацетатом водорастворимым усиливает контрацептивный эффект, изменяя биологические свойства влагалищной среды, повышает вязкость слизи шейки матки, что тормозит подвижность сперматозоидов, а изменения в эндометрии матки препятствуют имплантации оплодотворенной яйцеклетки. У кобелей снижается уровень тестостерона, а, следовательно, половая активность.

Действующие вещества лекарственного средства хорошо всасываются в кишечнике и, биотрансформируясь в печени, полностью выводятся из организма с мочой в виде метаболитов в течение 48 часов.

СЕКС БАРЬЕР[®] капли для собак по степени воздействия на организм относятся к малоопасным веществам (4 класс опасности по ГОСТ 12.1.007-76), в рекомендуемых дозах не оказывают отрицательного влияния на организм животных.

III. Порядок применения

11. Бигормональный контрацептивный лекарственный препарат СЕКС БАРЬЕР[®] капли для собак применяют сукам для регуляции половой охоты (прерывания и задержки течки), предотвращения нежелательной беременности; кобелям – для регуляции половой охоты и связанного с ней агрессивного поведения.

12. Препарат противопоказан сукам породы грейхаунд, беременным и кормящим сукам, животным, не достигшим половой зрелости, а также при новообразованиях молочной железы, заболеваниях половых органов, при сахарном диабете и мочекаменной болезни.

13. При применении лекарственного препарата СЕКС БАРЬЕР[®] капли для собак следует соблюдать общие правила личной гигиены и техники безопасности, предусмотренные при работе с лекарственными средствами. По окончании работы вымыть руки теплой водой с мылом.

При случайном контакте лекарственного препарата с кожей или слизистыми оболочками глаз, их необходимо промыть большим количеством проточной воды. В случае проявления аллергических реакций и/или при случайном попадании препарата в организм человека следует немедленно обратиться в медицинское учреждение (при себе иметь инструкцию по применению препарата или упаковку).

Пустую упаковку из-под лекарственного препарата запрещается использовать для бытовых целей, она подлежит утилизации с бытовыми отходами.

14. Применение лекарственного препарата СЕКС БАРЬЕР® капли для собак беременным сукам, в период лактации, а также у потомства до достижения ими половозрелого возраста запрещено.

15. СЕКС БАРЬЕР® капли для собак применяют перорально, капая на корень языка, на нос или в корм. Дозировка зависит от массы животного и цели применения (см. таблицу):

Таблица

Вид животного	Назначение препарата		Масса тела животного	Дозировка	Курс применения	Начало приема	Примечания
Суки	Регуляция половой охоты	Прерывание течки	До 5 кг	1 капля	2 раза в день с интервалом 12 часов в течение 5-7 дней	Не позднее 2 дней с момента начала течки	1. Прекращение течки наступает после полного курса применения. 2. В отдельных случаях применение препарата продлевают до полного прекращения течки. 3. Прерывание течки рекомендуется проводить не более 1 раза в год.
			5,1 – 10 кг	2-4 капли			
	10.1-30 кг	5-8 капель	За 7-14 дней до предполагаемой течки	1. Позволяет сдвинуть течку примерно на 20-40 дней. 2. Задержку течки рекомендуется проводить не более 2 раз в год.			
Свыше 30 кг	9+1 капля на каждые последующие 5 кг массы тела	Двукратно с интервалом 24 часа			Не позднее 24 часов после спаривания	Более поздний срок дачи препарата значительно снижает эффект воздействия.	
	Предотвращение нежелательной беременности						
Кобели	Регуляция половой охоты и связанного с ней агрессивного поведения		До 5 кг	1 капля	2 раза в день с интервалом 12 часов в течение 5-7 дней	Не позднее 2 дней с момента начала половой охоты	1. Неэффективно применение препарата, если с момента начала половой охоты прошло более 2 дней. 2. Молодым кобелям в первый день курса назначают двойную разовую дозу одновременно. 3. Успокоение животного наступает после полного курса применения. 4. В отдельных случаях применение препарата продлевают до полного прекращения половой охоты. 5. Повторный курс проводится по необходимости.
			5,1 – 10 кг	2-4 капли			
			10.1-30 кг	5-8 капель			
			Свыше 30 кг	9+1 капля на каждые последующие 5 кг массы тела			

Молодым сукам в первую течку применять не рекомендуется из-за трудности определения времени начала половой охоты.

Через 2 – 3 месяца после отмены препарата происходит полное восстановление репродуктивной функции организма.

16. Побочных явлений и осложнений при применении СЕКС БАРЬЕР® капль для собак в соответствии с настоящей инструкцией, как правило, не наблюдается.

При индивидуальной непереносимости компонентов лекарственного препарата его применение прекращают.

17. Симптомы передозировки при применении СЕКС БАРЬЕР® капль для собак не установлены.

18. Информация об особенностях взаимодействия СЕКС БАРЬЕР® капль для собак с другими лекарственными препаратами отсутствует.

19. Особенности действия препарата при первом применении или при отмене не установлено.

20. Следует избегать пропуска очередной дозы препарата, так как это может привести к снижению терапевтической эффективности. В случае несоблюдения установленного срока повторного применения препарата, его следует применить как можно быстрее, в той же дозировке и по той же схеме.

При задержке в приеме лекарственного препарата менее 12 часов, терапевтическая эффективность не снижается.

21. СЕКС БАРЬЕР® капли для собак не предназначены для применения продуктивным животным.

Наименования и адреса производственных площадок производителя лекарственного препарата для ветеринарного применения.

ООО «НВП «Астрафарм», 117246, г. Москва, Научный проезд, дом 20, стр. 3. Тел/факс: (495) 785-83-50/70.

ООО «НПК «СКиФФ», 117246, г. Москва, Научный проезд, дом 20, строение 3. Тел/факс: (495) 785-83-50/70.

Наименование, адрес организации, уполномоченной держателем или владельцем регистрационного удостоверения лекарственного препарата на принятие претензий от потребителя.

ООО «НВП «Астрафарм» 117246, г. Москва, Научный проезд, дом 20, строение 3, этаж 3, помещение I, комната 35. Тел/факс: (495) 785-83-50/70.

Директор ООО «НПК «СКиФФ»



Т. В. Берштайнис