

ИНСТРУКЦИЯ

по применению СУБТИЛИС-Ж для профилактики и лечения дисбактериозов и повышения естественной резистентности организма животных, в том числе птиц и рыб

(организация-разработчик ООО «НИИ Пробиотиков», г. Москва)

I ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1. Торговое название: СУБТИЛИС-Ж (SUBTILIS)®™;

Международное непатентованное название (МНН): - *Bacillus subtilis*, *Bacillus licheniformis*.

2. Лекарственная форма - суспензия для перорального применения. В 1 мл препарата содержатся спорообразующие бактерии *Bacillus subtilis* ВКМБ-1601Д/ВКМ В-2250Д и *Bacillus licheniformis* В-1602 /ВКМ В-2252 Д в количестве не менее 5×10^8 КОЕ (колониобразующих единиц) каждого штамма и вода до 100%. Штаммы бактерий не подвергались генетической модификации.

СУБТИЛИС-Ж представляет собой суспензию бежевого цвета .

3. Выпускают расфасованным по 5; 10; 15 мл и по 1 л в стерильных стеклянных флаконах и бутылках полиэтиленовых. Флаконы закрывают резиновыми пробками, укрепленными алюминиевыми колпачками. Допускается применение других упаковочных материалов, по качеству не ниже указанных. Герметично закрытые флаконы упаковывают в картонные коробки. Каждую единицу фасовки снабжают инструкцией по применению.

Срок годности – 24 месяца с даты выпуска при соблюдении условий хранения и транспортирования. СУБТИЛИС-Ж по истечении срока годности применяться не должен.

4. Хранят СУБТИЛИС-Ж в закрытой упаковке организации-производителя, в сухом, защищенном от прямых солнечных лучей месте при температуре от 2°C до 25°C.

5. СУБТИЛИС-Ж следует хранить в местах, недоступных для детей.

6. Флаконы и бутылки с препаратом без маркировки, с истекшим сроком годности, с нарушением целостности и/или герметичности упаковки, с измененным цветом, с наличием посторонних примесей, а также остатки препарата, неиспользованные в течение 5

дней после вскрытия, подлежат выбраковке с последующей утилизацией с бытовыми отходами.

II ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ (БИОЛОГИЧЕСКИЕ) СВОЙСТВА

7. Спорообразующие бактерии рода *Bacillus*, входящие в состав препарата, отличаются высокой устойчивостью к пищеварительным сокам и ферментам желудочно-кишечного тракта животных и обладают антагонистической активностью в отношении грамотрицательной и грамположительной патогенной и условно-патогенной микрофлоры. Ферменты, продуцируемые каждым штаммом (амилолитические, протеолитические, целлюлозолитические, липолитические, пектинолитические), усиливают антагонистические свойства препарата. В результате этих процессов снижается токсическая нагрузка на организм животных, в том числе птиц и рыб, улучшается пищеварение, что позволяет сохранить поголовье и увеличить привесы у молодняка. Применение препарата повышает естественную резистентность организмов животных, в том числе птиц и рыб, восстанавливает уровень микрофлоры кишечника до физиологической нормы.

III ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ

8. СУБТИЛИС-Ж применяют для профилактики и лечения дисбактериозов, для повышения естественной резистентности, восстановления нормальной микрофлоры кишечника, в том числе после лечения антибиотиками и другими химиотерапевтическими препаратами.

9. Противопоказаний к применению препарата СУБТИЛИС-Ж не установлено.

10. Препарат СУБТИЛИС-Ж применяют перорально методом индивидуальной или групповой дачи, смешивая его с водой, с молоком, заменителем цельного молока или кормом из расчета:

- новорожденным телятам – с первого дня жизни по 10 мл на голову один раз в день в течение 3 дней;
- взрослому крупному рогатому скоту - 20 мл на голову один раз в день в течение 5 дней;
- поросятам-сосунам – 2 мл на голову один раз в день в течение 5 дней;
- поросятам-отъемышам – 4 мл на голову один раз в день в течение 5 дней;
- цыплятам 1-10 дневного возраста – 100 мл на 1000 голов в течение 10 дней;
- молодняку кур-несушек и взрослым курам - 300 мл на 1000 голов в течение 10 дней, через 20 дней курс повторить;
- взрослым особям пушных зверей - по 1 мл на голову один раз в день в течение 5 дней,
- кроликам – 0,1 мл на 1 кг веса в течение 5 дней;
- собакам всех половозрастных групп - по 1 мл на голову один раз в день в течение 5 дней,
- кошкам - 0,5 мл на голову один раз в день в течение 5 дней;

- молоди форели, осетра, лосося — 0,2 мл на 1 кг веса в течение 10 дней;
- молоди карповых, взрослым особям форели, осетра, лосося — 0,1 мл на 1 кг веса в течение 10 дней.

11. При передозировке препарата СУБТИЛИС-Ж нежелательных реакций не выявлено.

12. Особенности действия препарата при первом приеме или его отмене не установлено.

13. Специальные меры при пропуске приема одной или нескольких доз препарата не предусмотрены, прерванный курс лечения и профилактики продолжают.

14. При применении препарата в соответствии с настоящей инструкцией побочных явлений и осложнений не отмечается.

15. Применение СУБТИЛИС-Ж не исключает использование других лекарственных средств.

16. Продукты животноводства, полученные во время и после приема СУБТИЛИС-Ж, используют без ограничений.

IV МЕРЫ ЛИЧНОЙ ПРОФИЛАКТИКИ

17. При применении препарата СУБТИЛИС-Ж следует соблюдать правила личной гигиены и техники безопасности, предусмотренные при работе с лекарственными препаратами ветеринарного назначения.

18. Специальные меры предосторожности при работе с СУБТИЛИС-Ж не требуются.

19. Организация-производитель - ООО «НИИ Пробиотиков» 117556, г. Москва, Варшавское шоссе, д.74, корп.1; Адрес производства: Тульская обл. г. Ефремов, ул. Московская застава, 1

Инструкция разработана ООО «НИИ Пробиотиков» (г. Москва).

Рекомендовано к регистрации в Российской Федерации ФГБУ «ВГНКИ»

С утверждением настоящей Инструкции утрачивает действие Инструкция по применению, утвержденная заместителем Руководителя Россельхознадзора 22 июля 2008 г.

Номер регистрационного удостоверения