

Эндогард

антигельминтик для собак в форме таблеток

Общие сведения

Торговое наименование лекарственного препарата: Эндогард (Endogard).

Международное непатентованное наименование: фебантел, пирантел памоат, празиквантел, ивермектин.

Лекарственная форма: таблетки в форме косточки для орального применения.

Выпускают лекарственный препарат в 3 дозировках: Эндогард 2,5 — для щенков и взрослых собак мелких пород, Эндогард 10 — для щенков и взрослых собак средних пород, и Эндогард 30 — для взрослых собак крупных пород.

Эндогард является антигельминтным препаратом широкого спектра действия, эффективным для лечения и контроля возникновения наиболее распространенных эндопаразитов у собак, активен в отношении всех фаз развития круглых и ленточных гельминтов.

Препарат губительно действует на микрофилярии, паразитирующие у плотоядных животных, а также предотвращает их развитие и тем самым профилактирует дирофиляриоз.

Одна таблетка Эндогарда содержит в качестве действующих веществ:

Действующие вещества	Эндогард 2,5 (на 225 мг)	Эндогард 10 (на 900 мг)	Эндогард 30 (на 2,7 г)
Фебантел	37.5 мг	150 мг	450 мг
Пирантел памоат	36 мг	144 мг	432 мг
Празиквантел	12.5 мг	50 мг	150 мг
Ивермектин	0.015 мг	0.06 мг	0.18 мг
Вспомогательные компоненты до:	225 мг	900 мг	2700 мг

По внешнему виду представляет собой коричневые таблетки в форме косточки от 225 до 2700 мг/таблетка.

Срок годности препарата при соблюдении условий хранения — 24 месяца со дня производства.

Запрещается применение препарата Эндогард по истечении срока годности.

Выпускают расфасованным по 2 или 6 таблеток в блистеры, упакованные в картонные коробки с инструкцией по применению.

Хранят препарат в закрытой упаковке производителя, в защищенном от прямых солнечных лучей месте, отдельно от продуктов питания и кормов при температуре от 0°C до 30°C.

Эндогард следует хранить в местах, недоступных для детей.

Неиспользованный препарат утилизируют в соответствии с требованиями законодательства.

Условия отпуска: без рецепта ветеринарного врача.

Порядок применения

Эндогард является антигельминтным препаратом широкого спектра действия, эффективным для лечения и контроля возникновения наиболее распространенных

эндопаразитов у собак. Также Эндогард используют для лечения лямблиоза и профилактики дирофиляриоза.

С целью профилактики дирофиляриоза в неблагополучных по заболеванию регионах препарат применяют в весенне-летне-осенний период (апрель-октябрь): за месяц до начала сезона лёта комаров и москитов (переносчиков возбудителя *Dirofilaria immitis*) однократно, далее 1 раз в месяц и последний раз в сезон через два месяца после завершения лёта насекомых.

Препарат применяют собакам однократно во время кормления в размельченном виде с небольшим количеством корма или вводят принудительно на корень языка после кормления по схеме:

	2.5 кг	5 кг	10 кг	15 кг	20 кг	30 кг	45 кг	60 кг
Эндогард 2,5	1 шт.	2 шт.						
Эндогард 10		0.5 шт.	1 шт.	1.5 шт.	2 шт.			
Эндогард 30				0.5 шт.		1 шт.	1.5 шт.	2 шт.

При лечении лямблиоза Эндогард применяется в той же дозировке, один раз в день, в течение трех дней.

Предварительной голодной диеты и применения слабительных средств перед дегельминтизацией не требуется.

Беременным и лактирующим сукам Эндогард можно применять при необходимости, строго соблюдая дозировку.

Эндогард нельзя применять щенкам моложе 2-недельного возраста.

Не применять вместе с пиперазином.

Меры личной профилактики

При работе с таблетками Эндогарда необходимо соблюдать общие правила личной гигиены и техники безопасности, предусмотренные при работе с лекарственными препаратами.

Людам с гиперчувствительностью к действующим веществам Эндогарда следует избегать прямого контакта с препаратом. При случайно попадании препарата на кожу или слизистые оболочки его необходимо тотчас смыть проточной водой с мылом. В случае появления аллергических реакций и/или при случайном попадании лекарственного препарата в организм человека следует немедленно обратиться в медицинское учреждение (при себе иметь инструкцию по применению препарата или этикетку).

Упаковку из-под использованного препарата помещают в полиэтиленовый пакет и утилизируют с бытовыми отходами.

Производитель: «Virbac», 1 ere avenue 2065M – L.I.D., Carros, France 06511