

ИНСТРУКЦИЯ

по применению препарата Капли инсектоакарицидные БАРС® форте для борьбы с эктопаразитами собак и кошек

(Организация-разработчик: ООО «НВЦ Агроветзащита», Россия, 129329, г. Москва, ул. Кольская, д. 1, стр. 1)

I. Общие сведения

1. Торговое наименование лекарственного препарата: Капли инсектоакарицидные БАРС® форте (Insecticidal acaricidal drops BARS® forte).

Международное непатентованное наименование действующих веществ: фипронил, дифлубензурон.

2. Лекарственная форма: раствор для наружного применения.

Капли инсектоакарицидные БАРС® форте в качестве действующих веществ содержат фипронил – 50 мг/мл и дифлубензурон – 1 мг/мл, а в качестве вспомогательных веществ эфирное масло цитронеллы, спирт изопропиловый, поливинилпирролидон, твин-80, полиэтиленгликоль 400.

3. По внешнему виду лекарственный препарат представляет собой прозрачную маслянистую жидкость от бесцветного до светло-желтого цвета.

Срок годности лекарственного препарата в закрытой упаковке производителя при соблюдении условий хранения - 2 года со дня производства. После вскрытия первичной упаковки лекарственный препарат хранению не подлежит. Запрещается применение лекарственного препарата по истечении срока годности.

4. Выпускают Капли инсектоакарицидные БАРС® форте расфасованными по 0,5, 1,0 и 1,8 мл в полимерные пипетки-капельницы разового использования, упакованные по 3 или 4 штуки в картонные пачки вместе с инструкцией по применению.

5. Хранят лекарственный препарат в закрытой упаковке производителя, в защищенном от прямых солнечных лучей месте, отдельно от продуктов питания и кормов, при температуре от 0 °С до 30 °С.

6. Капли инсектоакарицидные БАРС® форте следует хранить в местах, недоступных для детей.

7. Неиспользованный лекарственный препарат утилизируют в соответствии с требованиями законодательства.

8. Условия отпуска: без рецепта ветеринарного врача.

II. Фармакологические свойства

9. Капли инсектоакарицидные БАРС® форте относятся к комбинированным инсектоакарицидным лекарственным препаратам.

10. Лекарственный препарат обладает выраженной активностью в отношении личиночных и половозрелых фаз развития блох, вшей, власоедов, иксодовых и саркоптоидных (чесоточных) клещей, паразитирующих на собаках и кошках.

Механизм действия, входящего в состав лекарственного препарата фипронила заключается в блокировании ГАМК-зависимых рецепторов эктопаразитов, нарушении передачи нервных импульсов, что приводит к параличу и гибели насекомых и клещей. Дифлубензурон, ингибируя синтез хитина у насекомых, нарушает процесс линьки, яйцекладки и выводимости личинок из яиц, что приводит к прекращению пополнения популяции эктопаразитов.

После кожного нанесения лекарственного препарата входящие в его состав активные вещества, равномерно распределяются по поверхности тела, практически не всасываясь в системный кровоток, накапливаются в эпидермисе, волосяных луковицах и сальных железах, оказывают длительное контактное инсектоакарицидное и защитное (репеллентное) действие от клещей до 1 месяца, от насекомых - до 2 месяцев.

Капли инсектоакарицидные БАРС® форте по степени воздействия на организм относятся к умеренно опасным веществам (3 класс опасности согласно ГОСТ 12.1.007-76), в рекомендуемых дозах не оказывают резорбтивно-токсического, местно-раздражающего и сенсибилизирующего действия; при попадании в глаза вызывают раздражение. Лекарственный препарат токсичен для кроликов, пчел, а также рыб и других гидробионтов.

III. Порядок применения

11 Капли инсектоакарицидные Барс форте назначают собакам и кошкам с 8-недельного возраста с лечебной и профилактической целью при энтомозах, вызванных вшами, блохами, власоедами, саркоптозе и нотоэдрозе (чесотка), поражении иксодовыми клещами, а также для предотвращения нападения эктопаразитов на животных.

12. Противопоказанием к применению является повышенная индивидуальная чувствительность животного к компонентам лекарственного препарата. Не подлежат обработке больные инфекционными болезнями, ослабленные и выздоравливающие животные.

13. Капли инсектоакарицидные БАРС® форте применяют путем капельного («spot-on») нанесения на сухую неповрежденную кожу.

Раздвинув шерсть, препарат наносят на кожу в несколько точек вдоль позвоночника: у основания головы, между лопатками, в область поясницы и хвост. Не допускать слизывания препарата.

Минимальная терапевтическая доза препарата для собак составляет 0,18 мл/кг массы животного, что соответствует 9 мг/кг фипронила и 0,18 мг/кг дифлубензурана, для кошек – 0,1 мл/кг массы животного, что соответствует 5

мг/кг фипронила и 0,1 мг/кг дифлубензурана.

С учетом массы и вида обрабатываемого животного выбирают фасовку необходимого объема и применяют лекарственный препарат в дозах, указанных в таблице.

Таблица

Масса животного	Доза на животное: препарата, мл /действующих веществ, мг	Объем в пипетке-капельнице / Доза в пипетках
собаки		
до 1 кг	0,18 мл /9 мг фипронила, 0,18 мг дифлубензурана	1,0 мл / 4 капли
от 1 до 5 кг*	1,0 мл /50 мг фипронила, 1,0 мг дифлубензурана	1,0 мл / 1 пипетка
от 5 до 10 кг	1,8 мл /90 мг фипронила, 1,8 мг дифлубензурана	1,8 мл/ 1 пипетка
от 10 до 20 кг	3,6 мл /180 мг фипронила, 3,6 мг дифлубензурана	1,8 мл/ 2 пипетки
от 20 до 30** кг	5,4 мл /270 мг фипронила, 5,4 мг дифлубензурана	1,8 мл/ 3 пипетки
КОШКИ		
до 1 кг	0,1 мл/5 мг фипронила, 0,1 мг дифлубензурана	0,5 мл/2 капли
от 1 до 3 кг	0,3 мл/15 мг фипронила, 0,3 мг дифлубензурана	0,5 мл/6 капель
от 3 до 10 кг***	1,0 мл/50 мг фипронила, 1,0 мг дифлубензурана	1,0 мл/1 пипетка

*) **) ** *) При обработке щенков массой более 5 кг препарат применяют из расчета 1 пипетка объемом 1 мл на 5 кг массы, при обработке собак массой более 30 кг - 1 пипетка объемом 1,8 мл на 10 кг; при обработке кошек массой более 10 кг - 0,1 мл/кг массы животного.

С целью профилактики энтомозов и поражения животных иксодовыми клещами обработки проводят 1 раз в месяц, с лечебной целью - по показаниям, но не чаще 1 раза в месяц.

При саркоптоидозах (чесотке) препарат применяют 1 раз в месяц до клинического выздоровления животного, которое подтверждают двумя отрицательными результатами микроскопических исследований соскобов с пораженных участков кожи. При инвазиях, осложненных инфекцией бактериальной или грибковой этиологии, рекомендуется применение иммуномодулирующих, антибактериальных или противогрибковых средств.

Для уничтожения иксодовых клещей на теле животного препарат в количестве 1 капли наносят на клеща и место его прикрепления к коже. Если в течение 20-30 минут клещ самопроизвольно не отпадает, то его аккуратно вытаскивают из тела пинцетом и уничтожают.

Действие лекарственного препарата проявляется через 12-24 часа, учитывая это, обработки следует проводить не позднее, чем за сутки до

предполагаемого выгула животного в местах возможного обитания эктопаразитов (парки, скверы, лес).

В целях предотвращения повторной инфекации животным заменяют или обрабатывают подстилки, попоны и пол в помещениях, где содержат животных, разрешенным к использованию инсектицидным средством в соответствии с инструкцией по применению.

В течение 48 часов после обработки не следует купать животное в природных водоемах, а также мыть с моющим средством в течение 3 суток перед и после обработки. Следующие купания животного без моющих средств не влияют на продолжительность действия препарата.

14. При передозировке или попадании препарата внутрь у животного может наблюдаться избыточное слюноотделение, мышечная дрожь, рвота. Специфические средства детоксикации отсутствуют, применяют общие меры, направленные на выведение лекарственного препарата из организма.

15. Особенности действия препарата при его первом применении и отмене не выявлено.

16. Запрещается применение препарата беременным и лактирующим самкам, щенкам и котятм моложе 8-недельного возраста.

17. Следует избегать нарушений схемы применения препарата, так как это может привести к снижению эффективности. В случае пропуска очередной обработки ее проводят в той же дозе по той же схеме.

18. Побочных явлений и осложнений при применении препарата Капли инсектоакарицидные БАРС® форте в соответствии с настоящей инструкцией, как правило, не наблюдается. При повышенной индивидуальной чувствительности животного к компонентам препарата и проявлении аллергических реакций, обработку прекращают, препарат смывают водой с моющим средством и проводят десенсибилизирующую терапию.

19. Капли инсектоакарицидные БАРС® форте не следует применять одновременно с другими инсектоакарицидными препаратами для обработки животных. Сведения о его несовместимости с лекарственными средствами других фармакологических групп и кормовыми добавками отсутствуют.

16. Препарат не предназначен для применения продуктивным животным.

IV. Меры личной профилактики

21. При работе с лекарственным препаратом Капли инсектоакарицидные БАРС® форте следует соблюдать общие правила личной гигиены и техники безопасности, предусмотренные при работе с лекарственными препаратами.

22. Людям с гиперчувствительностью к компонентам лекарственного препарата следует избегать прямого контакта с препаратом Капли инсектоакарицидные БАРС® форте. Во время работы с препаратом не разрешается курить, пить и принимать пищу. По окончании работы следует тщательно вымыть руки теплой водой с моющим средством.

Не следует гладить и подпускать животное к маленьким детям до полного высыхания места нанесения препарата (в течение 24 часов после

обработки).

Пустую упаковку из-под лекарственного препарата запрещается использовать для бытовых целей; она подлежит утилизации с бытовыми отходами.

23. В случае появления аллергических реакций или при случайном попадании препарата в организм человека следует немедленно обратиться в медицинское учреждение (при себе иметь инструкцию по применению препарата или этикетку).

Наименование и адрес
производственной площадки
производителя лекарственного
препарата для ветеринарного
применения.

ООО «АВЗ С-П», Россия, 141305,
Московская область, г. Сергиев
Посад, ул. Центральная, д.1

Наименование, адрес организации,
уполномоченной владельцем или
держателем регистрационного
удостоверения лекарственного
препарата на принятие претензий от
потребителя.

ООО «АВЗ С-П», Россия, 141305,
Московская область, г. Сергиев
Посад, ул. Центральная, д.1

С согласованием настоящей инструкции считать утратившей силу инструкцию по применению Капель инсектоакарицидных Барс форте, утвержденную Россельхознадзором 26 февраля 2013 года.

Номер регистрационного удостоверения 77-3-2.17-3587 и ПБР-3-7.7/02043